



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Хабаровскому краю и ЕАО**



Памятка

опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и сорным растениям и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению на территории Хабаровского края, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 50.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. №



Клен ясенелистный (Acer negundo L.)

Дерево 10-15 см выс. Двудомное растение: мужские и женские цветы развиваются на разных растениях, и те, и другие лишены околоцветника. Цветки опыляются ветром.

Плоды двукрылатки, соединенные под острым углом, висят на длинных плодоножках и долго остаются на ветках осенью и зимой.

Листья сложные, непарноперистые, состоящие из 3–7 (редко 9) листочков, похожих на листья ясеня. Сверху светло-зеленые, снизу более светлые, опушенные.

Встречается по речкам поймам; повсеместно выращивается в лесополосах, городах и посёлках и всюду дичает, распространяясь самосевом в населённых пунктах, вдоль дорог и по долинам рек.



Черда облиственная (олиственная) (Bidens frondosa L.)

Однолетник 20-90 см выс. Листья тройчатые или перистые, сегменты листьев с хорошо выраженными черешочками, семянка по всей поверхности опушена прижатыми волосками.

Распространена повсеместно, обыкновенно. Берега водоёмов, сырые леса, обочины дорог, канавы, пустыри.



Двурядка тонколистная (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.)

Высота обычно 30–60 см, но может достигать и 70 см; стебли тонкие, прямостоячие, ветвистые, иногда полегают.

Листья в прикорневой розетке, продолговатые, перисто-рассечённые или перисто-раздельные, с ланцетно-линейными долями.

Соцветие — длинная, рыхлая кисть. Цветки ярко-жёлтые (иногда с оранжевым оттенком).

Плод — стручок, внутри которого семена расположены в два ряда (отсюда и название «двурядка»). Семена очень мелкие, похожи на маковые.

Распространяется в регионах с умеренным климатом. В природе его можно найти на нарушенных почв



Эхиноцистис шиловатый (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A.Gray)

Однолетняя лиана из семейства тыквенных, известная также в народе как «бешеный огурец»

Стебли: Тонкие и гибкие, длиной от 3 до 6 метров (иногда до 10 метров).

Листья: Зеленые, разделенные на 3–5 лопастей, похожи на ладонь.

Усики: Разветвленные, помогают растению цепляться за опоры и подниматься вверх.

Цветки: Мелкие, белые или желтоватые, с приятным ароматом, разделяются на мужские и женские на одном растении.

Плоды: Овальные, похожие на маленькие мешочки (до 5 см длиной), покрытые мягкими шипами. При созревании они могут резко раскрываться и выбрасывать семена.

Места произрастания: прибрежные зоны, поймы рек (семена хорошо разносятся водой), вдоль водоёмов, пустыри, обочины дорог, населённых пунктов, сады, дачные участки.



Мелколепестник щетинистый или однолетний (эригерон) (Erigeron strigosus Muhl. ex Willd.)


Однолетнее или двулетнее травянистое растение семейства Астровые, высотой от 30 до 100 см

Стебель прямой, высотой 30–100 см, ветвистый в верхней части.

Опушение отличается однородным прижатым опушением по всей длине стебля (отсюда и название — щетинистый).

Цветки мелкие корзинки собраны в щитковидное соцветие. Язычковые цветки белые, голубоватые или розоватые, трубчатые — желтые.

Растет на лугах, полях, вдоль дорог и на нарушенных землях.



Галинзога четырехлучевая (Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.)

Однолетнее травянистое растение, высота примерно 20–75 см.

Стебель единственный, разветвлённый, покрыт густым белым оттопыренным опушением и рассеянными желёзками.

Листья супротивные, яйцевидной формы (2–6 см в длину, 1,5–4,5 см в ширину), с клиновидным или выемчатым основанием и крупнозубчатым краем. На черешках, также с оттопыренным простым и коротким железистым опушением

Соцветия мелкие корзинки (4–5 мм в поперечнике), собраны в полусонтики на неравных опушённых цветоножках. Краевые ложноязычковые цветки обычно белые (реже розовые), трубчатые — жёлтые

Плод клиновидная, гранистая тёмно-серая семянка (1,5–1,8 мм длиной) с прижатым опушением. Хохолок плёнчатый: у краевых семян он заметно короче самой семянки, у срединных — равен ей или даже длиннее.

Предпочитает нарушенные местообитания: огороды, сады, пустыри, обочины дорог, пашни, территории около жилья. Часто выступает как сорное растение на возделываемых участках.



Ячмень гривастый (Hordeum jubatum L.)

Многолетнее травянистое растение семейства Злаки, образующее плотные дерновинки.

Высота — 15–50 см; стебли тонкие, гладкие; листья узкие, линейные. Главная особенность — пушистые колоски с длинными волосовидными остями (до 9 см), часто с фиолетово-розовым оттенком — за счёт них растение выглядит воздушным и «гривастым».

Встречается на нарушенных почвах: вдоль дорог, на пустырях, железнодорожных насыпях.



Недотрога железистая (железконосная) ***(Impatiens glandulifera Royle)***

Однолетнее травянистое растение из семейства Бальзаминовые.

Высота до 2 м; стебель толстый, сочный, полый, узловатый.

Листья яйцевидно-ланцетные, длиной 6–12 см, с зубчатым краем; в узлах собраны по 3–4 листа, у основания — тёмно-красные желёзки (отсюда название).

Цветки крупные (3–3,5 см), зигоморфные, на длинных цветоносах; окраска — от белой до винно-красной, чаще лилово-розовая; собраны в пазушные кисти по 2–14 штук.

Плоды коробочки, которые при созревании от лёгкого прикосновения резко раскрываются—створки скручиваются спиралью и разбрасывают семена на расстояние до 10 м (отсюда народное название «недотрога»).

Предпочитает влажные тенистые места—берега водоёмов, сырые овраги, лесные опушки, но активно заселяет и нарушенные местообитания.



Кислица рогатая (Oxalis corniculata L.)

Травянистое растение. По разным данным, может быть однолетним, двулетним или многолетним.

Стебель: тонкий, округлый, опушённый, часто лежащий или раскидистый, с ветвями, которые обычно укореняются в узлах. Высота — примерно 7–50 см.

Листья: тройчатые (состоят из трёх листочков). Листочки почти сердцевидные, обратнойцевидные, по краю ресничатые, иногда опушены с нижней стороны. На опушённых черешках. Характерная особенность: листочки складываются на ночь, перед дождём или при ярком солнце.

Цветки: мелкие, жёлтые, пятилепестковые. Собраны в небольшие соцветия. Цветёт в мае–июле.

Плод: цилиндрическая опушённая коробочка. При созревании она раскрывается, и семена разбрасываются.

Особенности: содержит органические кислоты (щавелевую, яблочную, лимонную), из-за чего листья имеют кисловатый вкус. В народной медицине используют части растения.

Встречается на сорных местах, в садах, по арыкам, полям, берегам рек.



Кислица прямостоячая (Oxalis stricta L.)

Однолетнее или малолетнее травянистое растение семейства Кисличные.

Стебель прямостоячий, простой или ветвистый, высотой 15–45 см, нередко красноватый, слабо опушённый.

Листья тройчатые, листочки обратносердцевидные, по краю реснитчатые; листья могут складываться при неблагоприятных условиях (яркий свет, дождь).

Цветки жёлтые, пятилепестковые, собраны в небольшие соцветия по 2–5 штук; лепестки длиной 5,5–8 мм.

Плод продолговатая ребристая коробочка (12–20 мм), покрытая отстоящими волосками; при созревании резко раскрывается и разбрасывает семена.

Встречается на нарушенных почвах — в садах, огородах, на пустырях, вдоль дорог.



Медуница мягкая (мягенькая) (Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.)

Многолетнее травянистое растение семейства Бурачниковые (Boraginaceae).

Высота: 20–40 (иногда до 50) см.

Корневище: толстое, короткое, чёрно-бурое, с пучком шнуровидных придаточных корней и мощной розеткой прикорневых листьев.

Стебель прямостоячий, местами железистый, у соцветия разветвляется. Основание стебля покрыто бурыми чешуями (остатками прикорневых листьев).

Листья прикорневые — крупные, эллиптические, с острой верхушкой, на длинном крылатом черешке, на ощупь бархатистые из-за густого мягкого опушения. Стеблевые — более мелкие, сидячие, со стеблеобъемлющим основанием; верхние — опушённые, с примесью мелкого железистого пушка.

Соцветие завитки, собранные в щитковидную метёлку.

Цветки венчик фиолетово-синий, но до распускания бывает розовым. Трубка венчика внутри густо опушена, отгиб разделён на полукруглые лопасти.

Плод чёрно-бурые, блестящие орешки длиной 3–5 мм, на верхушке туповатые.

Растёт в светлых лиственных и смешанных лесах, на опушках, лесных полянах, среди кустарников.



Золотарник гигантский (Solidago gigantea Aiton)

Многолетнее травянистое растение из семейства Астровые (Asteraceae).

Высота 50–200 см (в благоприятных условиях нередко превышает 2 м).

Стебель прямостоячий, крепкий, обычно простой или слабоветвистый в верхней части, голый либо слегка опушённый.

Листья продолговато-ланцетные, по краю пильчатые; нижние—на черешках, верхние—сидячие. Листовая пластинка с выраженной центральной жилкой.

Соцветие крупная метёлка из многочисленных мелких корзиночек; общая длина соцветия может достигать 40–50 см. Цветки ярко-жёлтые, исключительно трубчатые (краевых ложноязычковых цветков нет).

Плод: семянка с хохолком, легко разносится ветром.

Распространился как инвазивный вид: активно заселяет луга, опушки, обочины дорог, вырубки, пустыри, нередко вытесняя местные виды.

